RUMIDATA

SÉRIE GADO DE LEITE

E-BOOK GRATUITO

# CHECKLIST DA VISITA TÉCNICA À FAZENDA LEITEIRA

Roteiro setor por setor, com metas de referência, para avaliar a fazenda em uma visita e sair com um plano de ação

ORDENHA

CRIA E RECRIA

LACTAÇÃO

DIETA

AMBIÊNCIA



REBANHO

NUTRIÇÃO

LEITE

INDICADORES

SAÚDE

# Checklist da Visita Técnica à Fazenda Leiteira

**© 2026 RumiData.** E-book gratuito.

Esta obra é protegida pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais). O compartilhamento é permitido somente na íntegra, sem alterações e com os créditos à RumiData. É proibida a venda, a alteração do conteúdo e a reprodução de partes isoladas sem autorização prévia e por escrito da RumiData.

**Aviso técnico.** Este e-book tem finalidade técnica e educativa. As recomendações apresentadas são referências gerais, baseadas na literatura citada, e não substituem a avaliação do médico veterinário ou zootecnista responsável pela propriedade, que deve ajustá-las à realidade de cada rebanho, ao resultado das análises de alimentos e à legislação vigente.

Diagnóstico, tratamentos, protocolos hormonais, calendários vacinais e doses de medicamentos são de responsabilidade do médico veterinário; este material não traz doses de medicamentos. Valores marcados como **estimativa** vêm de experiência de campo ou de cálculos ilustrativos, e não de um ensaio publicado. Preços, quando aparecem, são ilustrativos.

**Edição:** 1ª edição, novembro de 2026. Série Gado de Leite.

**Como citar:** RUMIDATA. *Checklist da Visita Técnica à Fazenda Leiteira*. [S. l.]: RumiData, 2026. E-book (PDF).

**Ciência no cocho, resultado na balança.**

www.rumidata.com.br

Aponte a câmera do celular para o código e conheça os outros materiais da RumiData.

# Sumário


01 Como usar este checklist

02 Ordenha e qualidade do leite

03 Bezerreiro

04 Recria e novilhas

05 Vacas em lactação

06 Pré-parto e pós-parto

07 Dieta das vacas (TMR)

08 Silagem

09 Ambiência, água e instalações

• Plano de ação da visita

## 01 Como usar este checklist

Uma boa visita técnica segue sempre o mesmo roteiro. Assim, nada fica esquecido e é possível comparar uma visita com a anterior. Este checklist organiza a fazenda leiteira em oito setores, com as metas de referência da matriz de indicadores RumiData.

- Marque cada item como **OK** (dentro da meta) ou **Atenção** (fora da meta ou não avaliado).
- Anote o valor encontrado sempre que possível; números permitem acompanhar a evolução.
- Ao final, escolha no máximo três prioridades para a próxima visita.

**Antes de ir à fazenda, peça**

- Últimos resultados de qualidade do leite (gordura, proteína, ureia ou NUL, CCS e CPP).
- Produção por lote e número de vacas em lactação, secas e novilhas.
- Registro de partos, doenças (retenção de placenta, metrite, cetose, mastite, casco) e mortes de bezerras.
- Dieta de cada lote e análises recentes de silagem e concentrados.

## 02 Ordenha e qualidade do leite

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Gordura do leite (Holandês) | ≥ 3,5% | ☐ / ☐ |
| Proteína do leite (Holandês) | ≥ 3,2% | ☐ / ☐ |
| Nitrogênio ureico no leite (NUL) | 10 – 14 mg/dL (ureia ≈ 21 – 30 mg/dL) | ☐ / ☐ |
| CCS do tanque | < 200 mil cél/mL | ☐ / ☐ |
| CPP (CBT) | ≤ 100 mil UFC/mL | ☐ / ☐ |
| Temperatura do tanque | ≤ 4 °C | ☐ / ☐ |
| Rotina de ordenha | Pré-dipping, teste da caneca, secagem dos tetos e pós-dipping | ☐ / ☐ |
| Higiene da sala e do equipamento | Limpa, sem resíduos; borrachas em bom estado | ☐ / ☐ |

## 03 Bezerreiro

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Colostros com Brix ≥ 22% | ≥ 90% | ☐ / ☐ |
| Bezerras com Brix sérico ≥ 8,4% | ≥ 90% | ☐ / ☐ |
| Mortalidade (24 h a 60 dias) | < 3% | ☐ / ☐ |

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Diarreia | < 15% das bezerras | ☐ / ☐ |
| Pneumonia (1 a 60 dias) | < 10% das bezerras | ☐ / ☐ |
| Ganho até o desaleitamento (raças grandes) | 100 kg aos 90 dias (GMD > 666 g/dia) | ☐ / ☐ |
| Instalações | Secas, limpas, com sombra e água à vontade | ☐ / ☐ |

## 04 Recria e novilhas

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Idade ao primeiro parto (Holandês) | 22 – 24 meses | ☐ / ☐ |
| Peso à inseminação | ≈ 55% do peso adulto | ☐ / ☐ |
| Escore de condição corporal | 2,75 – 3,25 (crescimento) | ☐ / ☐ |
| Taxa de concepção das novilhas | > 50% | ☐ / ☐ |
| Cocho, bebedouro e sombra | Cocho limpo, água limpa, sombra suficiente | ☐ / ☐ |

## 05 Vacas em lactação

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Produção média por vaca | ≥ meta da fazenda | ☐ / ☐ |
| Escore de condição corporal (ECC) | ≥ 85% das vacas na faixa da fase; nenhuma ≤ 2,0 | ☐ / ☐ |
| Escore de enchimento ruminal | ≥ 75% das vacas na faixa da fase (3–4 em lactação) | ☐ / ☐ |
| Escore de fezes | ≥ 70% das vacas no escore ideal; sem sangue | ☐ / ☐ |
| Leitura de cocho | 1 a 2 dedos de sobra uniforme | ☐ / ☐ |
| Mastite clínica | < 2% das vacas ao mês | ☐ / ☐ |
| Problemas de casco | < 1% das vacas ao mês | ☐ / ☐ |
| Taxa de serviço / taxa de concepção | > 50% / > 35% | ☐ / ☐ |

## 06 Pré-parto e pós-parto

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Retenção de placenta (real) | < 8% | ☐ / ☐ |
| Metrite (30 dias) | Menos que o dobro da retenção | ☐ / ☐ |

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Cetose subclínica (BHB ≥ 1,2 mmol/L) | < 15% das vacas testadas | ☐ / ☐ |
| pH urinário (dieta aniônica) | 5,5 – 6,8 | ☐ / ☐ |
| Edema de úbere | < 1% | ☐ / ☐ |
| Ambiente do pré-parto e maternidade | Sombra, cama limpa, cocho e água suficientes, sem superlotação | ☐ / ☐ |

## 07 Dieta das vacas (TMR)

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Homogeneidade (início, meio e fim do trato) | Variação < 4% | ☐ / ☐ |
| Partícula da TMR (Penn State) | 19 mm 2–8% · 8 mm 30–50% · 4 mm 10–20% · fundo 30–40% | ☐ / ☐ |
| Seleção (sobra × fornecido) | Diferença média < 4% | ☐ / ☐ |
| Umidade (teste do bolo) | Forma um bom bolo (cerca de 50% de umidade) | ☐ / ☐ |
| Matéria seca da silagem medida na semana | Sim, com ajuste da carga do vagão | ☐ / ☐ |

## 08 Silagem

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Matéria seca | 32 – 37% | ☐ / ☐ |
| Partícula (Penn State, silagem de milho) | 19 mm 3–8% · 8 mm 45–65% · 4 mm 20–30% · fundo < 10% | ☐ / ☐ |
| Grãos (teste do copo) | Inteiros < 2 · mal quebrados < 3 | ☐ / ☐ |
| pH | 3,7 – 4,0 | ☐ / ☐ |
| Temperatura no painel | < 30 °C | ☐ / ☐ |
| Cheiro e cor | Cheiro adocicado; cor marrom-esverdeada | ☐ / ☐ |
| Face e vedação | Corte reto, firme, sem mofo; lona íntegra | ☐ / ☐ |

## 09 Ambiência, água e instalações

| Item | Meta (verde) | OK / Atenção |
|---|---|---|
| Sombra | Para todos os animais | ☐ / ☐ |
| Ventilação e aspersão | Funcionando e bem reguladas | ☐ / ☐ |
| Camas | Secas, limpas e macias | ☐ / ☐ |
| Bebedouros | Limpos, cheios e de fácil acesso | ☐ / ☐ |
| Cocho de sal mineral | Com sal, sem empedrar | ☐ / ☐ |
| Moscas e carrapatos | Controle adequado | ☐ / ☐ |
| Pistas, corredores e cochos | Limpos e drenados | ☐ / ☐ |

Metas da matriz de indicadores RumiData (versão de 06/11/2026), baseadas em IN 76/2018, IN 77/2018, DCHA, Lombard et al. (2020), Ettema e Santos (2004), Cornell NYSCHAP, Heinrichs (2013), Kung et al. (2018) e materiais técnicos de referência. Faixas "a validar" podem ser ajustadas pelo técnico responsável.

## Plano de ação da visita

| Prioridade | Problema encontrado | Ação combinada | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

**Quer se aprofundar?**

Cada setor deste checklist é tratado em detalhe nos e-books da Série Gado de Leite da RumiData: bezerras, recria, vacas em lactação, período de transição, preparo da dieta, silagem de milho, amido, proteína, minerais, qualidade do leite, micotoxinas, bem-estar e custo de produção. Conheça em www.rumidata.com.br.

# RUMIDATA

**Ciência no cocho, resultado na balança.**

www.rumidata.com.br

© 2026 RumiData. E-book gratuito. Lei nº 9.610/1998.
Compartilhamento permitido somente na íntegra e com créditos. Venda proibida.